

ความรู้เกี่ยวกับ

โรคฝีดาษลิง



เกิดจากเชื้อไวรัส **Othopoxvirus** ธรรมชาติของเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดนี้ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ และติดต่อไปยังสัตว์อื่น ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น เช่น กระรอกดิน

การติดต่อ

จากสัตว์สู่มนุษย์

- จากการสัมผัสทางผิวหนัง
- เยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก ตา



จากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค



- สารคัดหลั่ง เลือด ผิวหนัง
- การนำซากสัตว์ป่วยมาปรุงอาหาร
- การถูกสัตว์ป่วย ข่วน กัด หรือสัมผัส เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้น

จากมนุษย์สู่มนุษย์

- ละอองฝอยทางการหายใจ
- การสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งและรอยโรคที่ผิวหนังของผู้ป่วย
- การสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หลังได้รับเชื้อโรคนี้มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 7 - 14 วันหรืออาจนานได้ถึง 21 วัน

****โอกาสในการแพร่จากคนสู่คนค่อนข้างต่ำ****

อาการ

- ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
- อ่อนเพลีย และมีต่อมน้ำเหลืองโต
- อาการทางผิวหนัง มักเกิดหลังจากไข้ลดลง โดยเริ่มมีผื่นที่บริเวณใบหน้าก่อน หลังจากนั้นจะลามไปส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตุ่มหนอง จะตกสะเก็ดในภายหลัง และอาจจะมีแผลเป็นตามมาได้



การวินิจฉัย

วินิจฉัยจากประวัติและอาการ ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR โดยใช้ของเหลวจากตุ่มน้ำที่ผิวหนัง

ข้อแตกต่างระหว่างฝีดาษลิงและฝีดาษคือในฝีดาษจะไม่มีอาการต่อมน้ำเหลืองโต เช่นเดียวกับในฝีดาษลิง ภายใน 1 - 3 วัน

การรักษา



การรักษาโดยให้ยาต้านไวรัส cidofovir, Tecovirimat, brincidofovir

ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ แต่ก็พบว่ามีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้ โดยกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดคือกลุ่มเด็กเล็ก

การป้องกัน

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่/แอลกอฮอล์เจล
- งดรับประทานของป่า/ปรุงอาหารจากสัตว์ป่า
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัตว์ป่าป่วย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการ
- การฉีดวัคซีนที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา คือ JYNNEOS



แฮร์ไต้ชัวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-354-5222
หรือ แอดไลน์@skinthailand
หรือ สแกน QR Code



สมาคมแพทย์
ผิวหนังแห่งประเทศไทย



สถาบันโรคผิวหนัง

นายแพทย์สุประภิต จิรรัตน์วัฒนา
สถาบันโรคผิวหนัง